













# Metronidazol 250 mg


Intervenciones tempranas de emergencia para noma y sospechosos de lesiones pre-noma y otras infecciones









 **Recien Nacido**  
0-1 semana o <2 kg  
7 tabletas para 14 días


			
MAÑANA	MEDIO-DIA	TARDE	NOCHE
15 mg/kg		15 mg/kg	









 **Lactantes**  
1 semana - 2 meses o  
2-5 kg (4.5-10lbs)  
7 tabletas para 14 días

			
MAÑANA	MEDIO-DIA	TARDE	NOCHE
			


 **Infantes**  
2-12mos o 5-9 kg (10-12lbs)  
14 tabletas para 14 días

			
MAÑANA	MEDIO-DIA	TARDE	NOCHE
			

 **Pre-escolar**  
1-4 años o 10-19 kg (20-40lbs)  
28 tabletas para 14 días

			
MAÑANA	MEDIO-DIA	TARDE	NOCHE
			

 **Edad Escolar**  
5-11 años o 20-40 kg (40-90lbs)  
56 tabletas para 14 días

			
MAÑANA	MEDIO-DIA	TARDE	NOCHE
			

 **Joven/Adulto**  
12 años hasta adulto  
112 tabletas para 14 días

			
MAÑANA	MEDIO-DIA	TARDE	NOCHE
 	 	 	 

## Notas:

- Al primer signo de noma, empiece con METRONIDAZOL 250mg/tableta. Continúe 14 días.
- Mantenga METRONIDAZOL 250 mg en la botiquin de emergencia de los paquetes de Supervivencia Infantil en cada aldea para evitar atrasos en el tratamiento.
- Trate la gingivitis necrotizante seguidamente sarampión o malaria en niños desnutridos para prevenir el progreso de noma. También incluye los micronutrientes esenciales, Vitamina A dosis triple, polvo dental, y mejor el estado nutricional (ej. huevos y aceite).
- Metronidazol con Amoxicilina es recomendando si ambos están disponible. Amoxicilina/clavulanato es otro excelente opción con o sin metronidazol.
- Ver el médico el más pronto posible. Continúe los tratamientos durante el viaje a la clínica u hospital. Cuando el niño viene para atención, provea la dosis completa del medicamento para que continúe el tratamiento aún con retrasos.
- Si la Amoxicilina es en capsula: Abra y dividir el contenido. La tableta puede ser molida y mezclada con la leche materna, alimentos, líquidos, o azúcar y alimente el niño con cuchara.
- Tomar con comida no es necesario per ayuda cuando el estomago esta irritado.
- También para infecciones oculares y despues de sarampión, use con Amoxicilina.
- Metronidazol también esta usada con tricomoniasis, vaginitis bacterianas, absceso amebiano en hígado, amebiasis intestinal, infecciones pelvica y abdominales (con otros antibioticos), giardiasis, c.difficile diarrea.
- Un niño críticamente desnutrido muchas veces no manifestará signos de enfermedad o infección. Por lo tanto este puede salvar la vida empezando un curso oral de antibioticos como amoxicilina, metronidazol, clotrimazol durante lo refiere para cuidados mas especializado.
- Categoría B: Segura en embarazo.