

El monitor \_\_\_\_\_ (Nombre/firma) ha explicado información apropiado verbalmente o por escrito sobre los medicamentos que sigue:

<b>Medicina:</b>	<b>Usos:</b>	<b>Dosis:</b>	<b>Peligre:</b>	<b>Fecha:</b>	<b>Firma:</b>
†Amoxicilina					
†Trimetoprima/ Sulfametoxazol					
†Acido Nalidixico					
†Eritromicina					
Azitromicina					
†Cloroquina					
†Primiquina					
†Acetaminofén o Paracetamol					
†Piperazina					
†Mebendazol					
†Sulfato Ferroso					
†Salbutamol					
†Prednisona					
†Litrosol/Solución de Rehidratación Oral (SRO)					
†Vitamina A					
†Nistatina					
Aspirina					
Ibuprofén					
†Adrenalina					
Ipecacua					
Metronidazol					
Ofloxicilina					
Diflucan					
Vitaminas, múltiple					
Prenatal					
Ped / Floruro / Hierro-Note dosis específicas_____					
Benzoato Bencilo de 25%(Escabicida)					
CremaTerapiaTriple:Inflamación/Hongo/Bacteria					
Crema Anti-Cándida/Vaginal/ Piel_____					
Crema Anti-Hongos_____					
Crema Anti-Inflamatoria_____					
Vendas Dome					
Ergonovina					
Vitamina K					
Antiácidos					
Contra/acidez producción (Ej:Rantidine)_____					
Terapia Triple Contra Gastritis/Ulceras _____					
Anti-inflamatorios_____					
Antiespasmódico Muscular_____					
Pomada antibacterial_____					
Pomada oftal. tetraciclina					
*Alta presión:_____					
*Epilepsia:_____					
*Diabetes:_____					
*Asma:_____					
Otros: Llene otra hoja si necesita_____					

\*Hipertensión, diabetes, epilepsia y asma son manejados por el medico, con vigilancia del monitor.  
 †Medicinas de AIN-C II. La mayoría debe usarse en tabletas o cápsulas, incluso con infantes, para proteger contra la contaminación de líquidos, confusión con dosis, y economizar recursos materiales.